

아기에게 불소유액을 주어도 하는가?

불소가 없는 지역에서는 아기가 6개월쯤 되었을 때 불소유액을 주기 시작해도 되는지 귀하의 의사나 치과의사에게 문의해 보십시오.

아기의 치아를 검사할 때 어떤 것을 점검해야 하는가?


아기의 앞니 윗쪽 치아 4개에 하얀 점이 있는지 점검해 보십시오. 하얀 점은 충치의 첫 신호입니다. 치아 안쪽과 바깥쪽 표면 모두를 점검해 보아야 합니다.

아기의 치아를 자주 점검해 보십시오.

귀하자신의 치아를 잘 관리하도록 하십시오!

귀하자신의 치아를 깨끗히 하고 점검할 수 있도록 정기적으로 치과의사의 진단을 받으십시오.

Your Baby's Teeth



Medical Assistance Administration

1998년 5월



Medical Assistance Administration

1998년 5월

우리 아기는 언제 치아가 생기기 시작하는가?

아기의 치아는 약 6개월 쯤 부터 나오기 시작합니다.

아기의 치아는 어떻게 닦아야 하는가?

출생했을 때 부터 젖은 헝겊이나 가제로 아기의 잇몸과 치아를 닦아주십시오.

아기가 치생하게 되면 어떻게 해야 하는가?

아기의 잇몸에 아픈곳이 있어서 안절부절하며 성을 내거나 잘 자지 않거나 먹지 않으며 설사를 합니다. 아기에게 차게 만든 치생용 링이나 깨끗한 헝겊 등 찬 것을 씹을 수 있도록 해 주십시오.

아기의 증상이 더 심할 경우는 의사의 진찰을 받으십시오. 열, 귀병 및 장기적인 설사는 치생으로 인해 발생하는 것이 아닙니다.

젖병 충치는 어떤 것인가?

심한 충치는 아기가 낮잠을 자거나 밤에 잘 때 우유, 휘몰락, 설탕물 또는 주스를 젖병으로 마실 경우 발생하는 것입니다. 아기가 낮잠을 잘 때나 밤에 잘 때 젖병을 주어야 할 경우는 물만 넣어서 주십시오.

아기의 첫번째 치과진료는 언제 받아야 하는가?

첫번째 치과진료는 아기의 첫번째 생일쯤 돼서 시작하면 됩니다. 치아에 문제가 있을 경우는 더 일찍 치과의사의 진료를 받으십시오.

고무젓꼭지나 엄지손가락을 빠는 것은 아기의 치아에 나쁜 것인가?

아닙니다. 1세가 될 때까지는 괜찮습니다. 아기들은 빨아야 한다는 강한 필요성을 지니고 태어납니다. 그러나 계속 빨게 되면 아기의 치아의 위치를 바꿔놓아서 후에 문제가 됩니다. 엄지손가락이나 고무젓꼭지를 빠는 것에 대한 걱정이나 질문이 있을 경우는 귀하의 치과의사나 의사에게 문의해 보십시오.

아기의 치아를 보호하는 것은 왜 중요한 것인가?

아기의 치아는:

- 아기가 음식을 씹을 수 있게 해주며
- 아기가 말을 명료하게 할 수 있게 해주며
- 영구치가 제자리를 잡을 수 있게 도와주며
- 턱과 얼굴의 모양을 만들어 주며
- 아기의 건강에 도움이 되는 한편 웃을 때 보기가 좋습니다!

